



Co.B.U.S.  
Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del  
Sangue  
SIMT di RAGUSA, MODICA, VITTORIA

*Al Servizio Farmacia*

## RICHIESTA CONCENTRATO COMPLESSO PROTROMBINICO

Data richiesta \_\_\_\_\_ Reparto \_\_\_\_\_

Ambulatoriale     Ricovero ordinario     Ricovero DH    n° cartella clinica/scheda \_\_\_\_\_

Si richiedono n° \_\_\_\_\_ flaconi di Concentrato complesso protrombinico (CCP) 500 UI

per il paziente: \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

Diagnosi \_\_\_\_\_

PT INR \_\_\_\_\_ aPTT \_\_\_\_\_ Dosaggio fattori \_\_\_\_\_ Eseguiti in data \_\_\_\_\_

### INDICAZIONI

Contrassegnare con una X l'indicazione all'uso

- Correzione dell'eccesso di anticoagulazione da dicumarolici o per interrompere una terapia anticoagulante orale (TAO) in situazioni di emergenza (emorragia acuta maggiore, intervento chirurgico indifferibile)**
- Deficit congenito documentato dei singoli fattore II, VII, IX e X per la profilassi e il trattamento delle emorragie in assenza di concentrati specifici**
- Deficit acquisito dei fattori del complesso protrombinico (grave epatopatia, riduzione da perdita o diluizione), in alternativa al plasma fresco congelato, come presidio di seconda scelta in presenza di emorragia o in preparazione ad interventi chirurgici con rischio di emorragia**

Le indicazioni sono in linea con le Raccomandazioni SIMTI sul corretto utilizzo degli emocomponenti e plasmaderivati adottate dal CoBUS dell'ASP 7.

**Correzione dell'eccesso di anticoagulazione da TAO in situazioni di emergenza (emorragia acuta maggiore, intervento chirurgico indifferibile)**

Sospendere la TAO in corso ed eseguire controllo INR

Somministrare vitamina K al dosaggio di 10mg/100 mL di soluzione fisiologica, lentamente ev in circa 30'

Infondere CCP ai seguenti dosaggi, lentamente in 10-15 minuti:

- INR < 2                      somministrare 20 UI/Kg
- INR fra 2-4                   somministrare 30 UI/Kg
- INR > 4                      somministrare 50 UI/kg

Ripetere l'INR dopo l'infusione e accertarsi che sia < 1,5; in caso contrario ripetere la somministrazione di CCP, secondo lo schema precedente.

Per i deficit congeniti dei fattori FII, FX è indicato un dosaggio di 20-30 UI/Kg. I dosaggi e la durata della terapia sostitutiva vanno regolati in base alla severità dell'alterazione emostatica, della localizzazione e dell'estensione dell'emorragia e della situazione clinica.

**N.B. La farmacia non è autorizzata a consegnare gli emoderivati se la richiesta non è correttamente compilata in tutte le sue parti. Si raccomanda di conservare in cartella una copia della presente richiesta.**

Timbro e firma del medico richiedente

Parte riservata alla farmacia

N. flaconi consegnati: \_\_\_\_\_ N. lotto \_\_\_\_\_ Il Farmacista \_\_\_\_\_