


| | | |
|--|---|--|
|  <p>ASP RAGUSA Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Dipartimento Materno-Infantile</p> | <p>CHECK LIST DELL'OSTETRICO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA MEN DA ANTI Rh (D)</p> | <p>MEN/A1 Rev. N° 05 21/06/2012</p> |
|--|---|--|

DURANTE LA GRAVIDANZA

- Verificare la tipizzazione gruppo-ematica della paziente e richiedere la ricerca di anticorpi irregolari al primo e al terzo trimestre di gravidanza (Test di Coombs indiretto).
- Richiedere la valutazione della emorragia feto materna (EFM) in caso di eventi particolari quali traumi addominali, aborti, gravidanze extrauterine avvenuti dopo la 20^a settimana e praticare la profilassi prenatale alla dose consigliata dal SIMT.
- Proporre la profilassi prenatale alla 28^a settimana inviando la paziente al SIMT di pertinenza

IN SALA PARTO

- Prelevare un campione di sangue alla puerpera in una provetta in EDTA dopo il secondamento per la valutazione dell'EFM
- Prelevare un campione di sangue funicolare in EDTA per il gruppo e il test di Coombs diretto del neonato

IN REPARTO

- Attendere entro le 72 ore dal parto il referto gruppo del neonato e in caso di neonato Rh (D) positivo anche la fiala di immunoglobuline anti Rh (D) da somministrare alla paziente
- Attendere entro le 72 ore dal parto il referto della valutazione EFM sulla congruità della dose di Immunoglobuline anti Rh (D) da somministrare